


Información sobre la Sedación



Por favor, lea esta guía cuidadosamente y consúltenos si tiene alguna pregunta.



Tipos de Anestesia

El tipo de anestesia que elija va a depender de:

- el tipo de procedimiento que va a realizarse
- la clínica donde se realizará el procedimiento
- alguna condición médica que pueda tener
- su preferencia personal.

Anestesia local

Se administra una inyección para adormecer una parte de su cuerpo. Estará despierto y consciente de lo que está sucediendo. Podría experimentar alguna incomodidad durante el procedimiento.

Sedación intravenosa (IV)

Se utiliza una aguja para introducir un tubo delgado de plástico en la vena de la parte posterior de su mano o brazo. Se administran pequeñas cantidades de medicación para que se sienta relajado y somnoliento. En la mayoría de los casos, no estará consciente durante el procedimiento ni lo recordará después.

- **Sedación consciente**

A veces se requiere o prefiere un nivel más ligero de sedación. Estará somnoliento, pero no inconsciente, y puede estar algo conciente de lo que está sucediendo. **Este es el único nivel de sedación disponible en nuestra clínica de Penrith.**

Anestesia general

Estará inconsciente y no sentirá dolor durante el procedimiento. Los medicamentos se administran de la misma manera que con la sedación o se inhalan como gases. Necesitará ayuda para respirar mediante una máscara o un tubo respiratorio. Solo utilizamos este tipo de anestesia para la ligadura de trompas (esterilización).

Sedación intravenosa y riesgos

Esta es la anestesia más utilizada para el aborto quirúrgico. También se usa a veces para la inserción de un DIU y la vasectomía.

Un médico capacitado revisará su salud y discutirá la sedación y los posibles riesgos. Este médico le administrará la sedación y lo cuidará durante su procedimiento.

Por favor, informe a su médico si ha tenido problemas con anestésicos anteriormente.

La sedación moderna es generalmente muy segura, pero existen algunos riesgos.

Reacción alérgica

Puede tener una reacción alérgica a los medicamentos de sedación pero esto es poco común. Informe al médico sobre cualquier reacción alérgica previa.

Espasmo de las vías respiratorias

Sus vías respiratorias pueden tensarse, dificultando la respiración. Informe al médico si fuma, tiene asma o ha tenido recientemente un resfriado o una infección respiratoria, ya que estos factores pueden aumentar el riesgo.

Aspiración

Puede vomitar y aspirar contenido gástrico. Esto puede afectar su respiración y causar neumonía. Es muy importante que siga las instrucciones de ayuno. Esto reducirá el riesgo de aspiración durante la sedación.

! Se pueden presentar otros riesgos poco comunes que afectan al corazón o a los pulmones. También pueden existir riesgos específicos a su persona. Su médico discutirá estos riesgos con usted.

Preparación para la sedación intravenosa

! Recuerde: Si elige recibir sedación intravenosa, una persona de apoyo debe llevarle a casa y quedarse con usted hasta el día después de su procedimiento.

Guías de ayuno

Si va a recibir sedación intravenosa, debe seguir estas normas. Si no sigue estas normas, tendremos que posponer o cancelar su cita.

Preparación para su cita

24 horas antes de su cita	No beba alcohol No consuma drogas ilegales
6 horas antes de su cita	No coma nada (incluidos caramelos y chicles). Puede seguir bebiendo 1 vaso pequeño de agua por hora.
2 horas antes de su cita	No beba nada

Puede tomar sus medicamentos habituales con un vaso pequeño de agua, a menos que alguien de nuestro equipo le indique lo contrario.

Luego de la sedación intravenosa

No puede recibir sedación intravenosa a menos que comprenda y haya organizado lo siguiente:

Luego de su procedimiento	Su persona de apoyo debe venir a la clínica a recogerle. Su persona de apoyo debe llevarle a casa (no puede tomar un taxi/Uber solo).
Durante la noche luego de su procedimiento	Su persona de apoyo debe quedarse con usted durante la noche después de su procedimiento.
Por 24 hours luego de su procedimiento	No conduzca ni maneje maquinaria No beba alcohol No tome decisiones importantes ni legales

La lactancia luego de la sedación

Si actualmente está lactando, asegúrese de haber preparado lo suficiente en anticipación para cubrir el tiempo que estará en la clínica. Para los medicamentos utilizados en nuestras clínicas, no es necesario esperar ni descartar nada. Después de su procedimiento, puede continuar lactando con normalidad.

Nuestro servicio de atención telefónica lo conecta con enfermeras certificadas con mucha experiencia, de 8am a 5pm, los días de semana.

Hola



**Cuidado
postoperatorio
gratuito**

Llame a nuestras enfermeras
de cuidado postoperatorio
al 1300 888 022
si tiene alguna preocupación

Atención y apoyo antes, durante y después de su procedimiento.

Intérprete:

Llame al 131 450 y
pida ser conectado con
MSI Australia
al 1300 003 707

Cuidado postoperatorio:

1300 888 022

msiaustralia.org.au

